

Total number of pages - 16

30T MATH

2020

MATHEMATICS

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions.*

Q. No. 1 (a-j) carries 1 mark each

$$1 \times 10 = 10$$

Q. Nos. 2-13 carry 4 marks each

$$4 \times 12 = 48$$

Q. Nos. 14-20 carry 6 marks each

$$6 \times 7 = 42$$

$$\text{Total} = 100$$

Contd.

1. Answer the following questions :

$1 \times 10 = 10$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Determine the relation R on the set of whole numbers ≤ 10 defined by

$$R = \{ (x, y) \mid 2x + 3y = 12 \}.$$

10 তকে সৰু বা সমান পূৰ্ণসংখ্যাৰ সংহতিত R সম্বন্ধটো এনেধৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ

$R = \{ (x, y) \mid 2x + 3y = 12 \}$ । সম্বন্ধটো নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) Write the principal value of

$$\cos^{-1} \left[\cos \left(\frac{-16\pi}{15} \right) \right].$$

$\cos^{-1} \left[\cos \left(\frac{-16\pi}{15} \right) \right]$ ৰ মুখ্য মান লিখা।

- (c) Let $A = [a_{ij}]$ is a square matrix of order 2 where $a_{ij} = i^2 - j^2$.

Then A is

- (i) Skew-symmetric matrix
- (ii) Symmetric matrix
- (iii) Diagonal matrix
- (iv) None of these.

ধৰা হ'ল $A = [a_{ij}]$ এটা 2 ক্রমৰ বৰ্গ মৌলকক্ষ য'ত $a_{ij} = i^2 - j^2$ । তেন্তে A এটা

- (i) বিষম-সমমিত মৌলকক্ষ
- (ii) সমমিত মৌলকক্ষ
- (iii) বিকৰ্ণ মৌলকক্ষ
- (iv) এটাও নহয়।

- (d) Find the derivative of x^3 with respect to x^2 .

1

x^2 সাপেক্ষে x^3 র অরকলজ উলিওৱা।

- (e) Find the equation of the tangent to the curve $y = f(x)$ at (x_0, y_0) , if $\frac{dy}{dx}$ does not exist at this point.

1

যদি $y = f(x)$ বক্রৰ (x_0, y_0) বিন্দুত $\frac{dy}{dx}$ স্থিত নহয়, তেন্তে বক্রডালৰ এই বিন্দুত
টনা স্পৰ্শকৰ সমীকৰণ লিখা।

- (f) If $\sec^{-1} x = \operatorname{cosec}^{-1} y$ ($|x| \geq 1, |y| \geq 1$), then find the value of

$$\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{y}\right).$$

1

যদি $\sec^{-1} x = \operatorname{cosec}^{-1} y$ ($|x| \geq 1, |y| \geq 1$),

তেন্তে $\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{y}\right)$ ৰ মান উলিওৱা।

- (g) Write the direction cosines of the vector \hat{j} .

1

\hat{j} ভেটৰৰ দিশাংকবোৰ লিখা।

- (h) Write the order of the differential equation representing the family of curves given by

$y = a \sin(x + b)$, where a and b are arbitrary constants.

1

$y = a \sin(x + b)$ য'ত a আৰু b যাদৃচ্ছিক ধৰক, সমীকৰণটোৱে বুজোৱা অৱকল
সমীকৰণটোৰ ক্ৰম লিখা।

- (i) The projections of a line on the axes are 3, 4 and $2\sqrt{6}$. Find the length of the line. 1

এডাল বেখাৰ অক্ষকেইডালত প্ৰক্ষেপ হ'ল 3, 4 আৰু $2\sqrt{6}$ । বেখাডালৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা।

- (j) If $x = \phi(t)$, then find $\int f(x) dx$. 1

$x = \phi(t)$ হ'লে $\int f(x) dx$ নিৰ্ণয় কৰা।

2. A relation R in the set $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\}$ is given by $R = \{(a, b) : |a - b| \text{ is a multiple of } 4\}$. Prove that R is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1.

4

দেখুওৱা যে $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\}$ সংহতিত সংজ্ঞাবন্ধ সম্বন্ধ $R = \{(a, b) : |a - b| \equiv 4 \text{ অৰ এটা গুণিতক}\}$ সমতুল্য সম্বন্ধ। 1ৰ লগত যুক্ত মৌলবোৰৰ সংহতি উলিওৱা।

OR / অথবা

Let $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ is defined by $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$. Show that f is a bijective function. $2+2=4$

ধৰা হ'ল $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$, য'ত $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ ৰে সংজ্ঞাবন্ধ। দেখুওৱা যে f এটা একেকী আচ্ছাদক ফলন।

3. Solve :

4

সমাধান করা :

$$\sin^{-1}(1-x) - 2\sin^{-1}x = \frac{\pi}{2}.$$

OR / অথবা

If $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ and $\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$, where $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$; then find the value of $\alpha - \beta$.
4

যদি $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ আৰু $\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$, যত $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$; তেন্তে $\alpha - \beta$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

4. Show that

4

দেখুওৱা যে

$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ca & cb & c^2 + 1 \end{vmatrix} = 1 + a^2 + b^2 + c^2.$$

OR / অথবা

If (যদি) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ and (আৰু) $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, then

examine whether the matrix $A^2 - 2B$ is singular.
4

তেন্তে $A^2 - 2B$ মৌলকক্ষটো অপ্রতিম হয়নে পৰীক্ষা কৰা।

5. Find all points of discontinuity of f , where

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

4

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{যদি } x \neq 0 \\ 0, & \text{যদি } x = 0 \end{cases}$$

অব দ্বাৰা সংজ্ঞাবদ্ধ ফলনটোৰ বিচ্ছিন্নতাৰ বিন্দুসমূহ উলিওৱা।

6. Find $\frac{dy}{dx}$, if

2+2=4

$$\frac{dy}{dx} \text{ উলিওৱা, যদি}$$

$$(a) \quad y^x = x^y$$

$$(b) \quad \cos y = x \cos(a+y).$$

7. Evaluate :

মান নির্ণয় কৰা :

$$(a) \quad \int \sqrt{x^2 + 2x + 5} \, dx$$

4

OR / অথবা

$$(b) \int \frac{6x+7}{\sqrt{(x-5)(x-4)}} dx$$

4

8. Evaluate :

মান নির্ণয় করা :

$$(a) \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x - \cos x}{1 + \sin x \cos x} dx$$

4

OR / অথবা

$$(b) \int_0^{\pi} \log(1 + \cos x) dx$$

4

9. If $x = a(\theta + \sin \theta)$ and $y = a(1 - \cos \theta)$, find $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $\theta = 0$. 4

যদি $x = a(\theta + \sin \theta)$ আৰু $y = a(1 - \cos \theta)$,

তেন্তে $\theta = 0$ ত $\frac{d^2y}{dx^2}$ ব মান নির্ণয় কৰা।

OR / অথবা

State Rolle's theorem and give geometrical interpretation of the theorem.

2+2=4

ব'ল'ব উপপাদ্যৰ সংজ্ঞা লিখা আৰু ইয়াৰ জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দর্শেৱা।

10. Solve the differential equation :

অৱকল সমীকৰণটোৱ সমাধান উলিওৱা :

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} + \operatorname{cosec}\left(\frac{y}{x}\right) = 0 ;$$

4

$$y = 0 \text{ when (যেতিয়া) } x = 1 .$$

OR / অথবা

$$(1 - x^2) \frac{dy}{dx} + 2xy = x \sqrt{1 - x^2} .$$

4

11. If $f(x) = x^3 - 6x^2 - 36x + 7$, find the interval for which $f(x)$ is

(i) strictly increasing

(ii) strictly decreasing.

2+2=4

$f(x) = x^3 - 6x^2 - 36x + 7$ ৰ দ্বাৰা নিৰ্দিষ্ট ফলনটো কোন অস্তৰালত

(i) সতত বৰ্দ্ধমান

(ii) সতত হ্রাসমান

উলিওৱা।

OR / অথবা

Find the area of the largest rectangle that can be formed having a perimeter of 40 meters. 4

এটা আয়তক্ষেত্রৰ পৰিসীমা 40 মিটাৰ। আয়তক্ষেত্রটোৰ কালি উলিওৱা যেতিয়া ই গৱিষ্ঠ।

12. Find a unit vector perpendicular to each of the vectors $\vec{a} + \vec{b}$ and $\vec{a} - \vec{b}$, where $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$. 4

$\vec{a} + \vec{b}$ আৰু $\vec{a} - \vec{b}$ ভেষ্টৰৰ লম্ব হোৱাকৈ এটা একক ভেষ্টৰ নিৰ্ণয় কৰা য'ত
 $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ আৰু $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$.

OR / অথবা

Let $\vec{a} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k}$ and $\vec{c} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$. Find a vector \vec{d} which is perpendicular to both \vec{a} and \vec{b} and $\vec{c} \cdot \vec{d} = 15$. 4

ধৰা হ'ল $\vec{a} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k}$ আৰু $\vec{c} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$. এটা ভেষ্টৰ \vec{d} নিৰ্ণয় কৰা য'ত \vec{d} , \vec{a} আৰু \vec{b} ৰ ওপৰত লম্ব আৰু $\vec{c} \cdot \vec{d} = 15$.

13. Bag A contains 6 red and 4 white balls; bag B contains 4 red and 6 white balls and bag C contains 5 red and 5 white balls respectively. A bag is selected at random and a ball is drawn from the selected bag. If the ball is found to be red, find the probability that the ball is drawn from bag A.

4

যথাক্রমে মোনা A ত 6টা রঙ আৰু 4টা বগা বল, মোনা B ত 4টা রঙ আৰু 6টা বগা আৰু মোনা C ত 5টা রঙ আৰু 5টা বগা বল আছে। যদৃচিকভাৱে এখন মোনাৰ পৰা এটা বল লোৱা হ'ল। যদি বলটো রঙ হয়, বলটো মোনা A-ৰ পৰা লোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

- A fair coin is tossed 10 times. Find the probability of getting exactly five heads.

4

এটা নিখুঁত মুদ্রা 10বাৰ টছ কৰা হ'ল। ঠিক পাঁচটা মুওপ্রাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

14. Using matrix method solve the following system of linear equations :

6

মৌলকক্ষীয় পদ্ধতিবে তলৰ বৈধিক সমীকৰণ প্ৰণালীটোৱ সমাধান উলিওৱা :

$$x - y + z = 4$$

$$2x + y - 3z = 0$$

$$x + y + z = 2$$

OR / অথবা

Using elementary transformation find the inverse of the following matrix : 6

মৌলিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করি তলৰ মৌলকফ্টোৰ প্রতিলোম মৌলকফ্স উলিওৱা :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & -5 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

15. Prove that the curves $x = y^2$ and $xy = k$ cut at right angles if $8k^2 = 1$. 6

প্ৰমাণ কৰা যে $x = y^2$ আৰু $xy = k$ বক্রই লম্বভাৱে কটাকটি কৰে যদি $8k^2 = 1$.

OR / অথবা

Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function f given by $f(x) = \cos^2 x + \sin x$, $x \in [0, \pi]$. 6

$f(x) = \cos^2 x + \sin x$, $x \in [0, \pi]$ ৰ দ্বাৰা নিৰ্দিষ্ট f ফলনটোৰ পৰম গৰিষ্ঠ আৰু পৰম লঘিষ্ঠ মান উলিওৱা।

16. Find the area of the region enclosed by the parabola $x^2 = y$, the line $y = x + 2$ and the x -axis . 6

$x^2 = y$ অধিবৃত্ত, $y = x + 2$ ৰেখা আৰু x -অক্ষই আণৰা ক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

Using integration find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are $(1, 0)$, $(2, 2)$ and $(3, 1)$. 6

অনুকলন করি $(1, 0)$, $(2, 2)$ আৰু $(3, 1)$ শীৰ্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা।

17. Find the vector equation of the line passing through the point $(1, 2, 1)$ and perpendicular to the plane $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 10$. 6

$(1, 2, 1)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা আৰু $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 10$ সমতলখনৰ লম্ব হোৱা ৰেখাডালৰ ভেষ্টৰ সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 6$ and $\vec{r} \cdot (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) = -5$ and the point $(1, 1, 1)$. 6

$\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 6$ আৰু $\vec{r} \cdot (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) = -5$ সমতলদুখনে কটাকটি কৰা ৰেখাৰ আৰু $(1, 1, 1)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা সমতলখনৰ ভেষ্টৰ সমীকৰণ উলিওৱা।

18. The two adjacent sides of a parallelogram are $(2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$ and $(\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k})$. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find the area of the parallelogram. 6

এটা সামান্তরিকৰ দুটা সমিহিত বাহু হল $(2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$ আৰু $(\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k})$ । ইয়াৰ
কৰ্ণৰ সমান্তৰাল একক ভেক্টৰ উলিওৱা। সামান্তরিকটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

For any two vectors \vec{a} and \vec{b} , prove that

6

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

যিকোনো দুটা ভেক্টৰ \vec{a} আৰু \vec{b} ৰ বাবে প্ৰমাণ কৰা যে

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|.$$

19. Solve graphically the following linear programming problem :

লৈখিক নিয়মেৰে তলৰ বৈধিক প্ৰগ্ৰামিং সমস্যাটোৰ সমাধান উলিওৱা :

Maximize or Minimize

$$Z = x + 2y$$

subject to constraints

$$x + 2y \geq 100$$

$$2x - y \leq 0$$

$$2x + y \leq 200$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

6

$Z = x + 2y$ ৰ সৰোচ আৰু সৰ্বনিম্ন মান উলিওৱা য'ত

$$x + 2y \geq 100$$

$$2x - y \leq 0$$

$$2x + y \leq 200$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

OR / অথবা

Maximize

$$Z = 1000x + 600y$$

subject to constraints

$$x + y \leq 200$$

$$x \geq 20$$

$$y \geq 4x$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

6

$Z = 1000x + 600y$ ৰ সর্বোচ্চ মান উলিওৱা য'ত

$$x + y \leq 200$$

$$x \geq 20$$

$$y \geq 4x$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

20. Two numbers are selected at random (without replacement) from the first six positive integers. Let X denotes the larger of the two numbers. Find mean of X . 6

প্রথম ছয়টা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰা পুনৰস্থাপন নকৰাকৈ যাদৃচ্ছিকভাৱে দুটা সংখ্যা বাছনি কৰা হ'ল। X যে প্ৰাপ্ত সংখ্যা দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰটোক সূচালে X ৰ মাধ্য নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

How many times a fair coin must be tossed so that the probability of having at least one head is more than 90% ? 6

এটা নিখুঁত মুদ্রা কিমান বাবে টছ কৰিব লাগিব যাতে কমেও এবাবে মুণ্ড পোৱাৰ সন্ধারিতা 90% তকে বেছি হয় ?

_____ x _____